



# La soluzione ION'Activ

IL PROGRAMMA COMPLETO  
PER IL SUCCESSO  
NEL PERIPARTO



In breve tempo otterrete

- ✓ Elevato apporto dei minerali essenziali
- ✓ Immediato ripristino dell'equilibrio dei macrominerali
- ✓ Migliore ingestione della razione e l'assorbimento del glucosio
- ✓ Ottima partenza della lattazione




— BOLI A BASE DI MINERALI ESSENZIALI NEL PERIPARTO —

Il benessere e la redditività della mandria possono essere notevolmente migliorati limitando l'incidenza delle malattie metaboliche delle vacche nel periparto.

Il controllo dell'Omeostasi Minerale diventa fondamentale.

**Attenzione ai primi 3 giorni del post parto: sono i più critici in cui ci giochiamo tutto il risultato in lattazione e riproduzione.**



## ION'Activ Start

La buona gestione dell'equilibrio Acido-Base al parto assicura la partenza della lattazione senza problemi.

Infatti:

- ✓ Contiene fonti di Calcio, Magnesio, Potassio, Sodio e Cloro altamente disponibili.
- ✓ Rilascia i componenti attivi in meno di due ore per l'assorbimento gradualmente in 5/6 ore.
- ✓ Ripristina rapidamente l'equilibrio minerale per migliorare sensibilmente l'ingestione.
- ✓ Ottima attività reidratante.

Si raccomanda di utilizzarlo in associazione con ION'Activ Kalc

IONACTIV START E IONACTIV KALC SI

DISTRIBUISCONO IL GIORNO DEL PARTO

x3

Da utilizzare in caso di:

- ◆ Bassa ingestione
- ◆ Rischio di malattie metaboliche
- ◆ pH delle urine < a 8,0
- ◆ Bilancio di Cationi-Anioni elevato prima del parto
- ◆ Bilancio di Cationi-Anioni basso dopo il parto



x2

Da utilizzare in caso di:

- ◆ Collasso puerperale
- ◆ Ipcalcemia subclinica
- ◆ Bassa ingestione di sostanza secca
- ◆ Bilancio Anioni-Cationi elevato prima del parto
- ◆ pH delle urine prima del parto >7,0



## ION'Activ Kalc

La buona gestione del Calcio e degli altri macroelementi al parto assicura la partenza della lattazione senza problemi.

Infatti:

- ✓ Apporta le fonti di Calcio, Magnesio e altri macro elementi altamente disponibili.
- ✓ Rilascia il Calcio in meno di due ore e per le successive 4/5 ripristinando la calcemia alterata.
- ✓ Il Calcio apportato rappresenta più del 70% del fabbisogno di Calcio ionizzato.
- ✓ Riduce i costi dei collassi puerperali.
- ✓ Limita i danni dell'ipocalcemia subclinica.

Si raccomanda di utilizzarlo in associazione con ION'Activ Start