

SCHEMA TECNICA

ERBAIO ESTIVO

L'erbaio primaverile-estivo viene seminato al termine della primavera fino al mese di luglio. Le condizioni climatiche molto spesso difficili costringono a selezionare varietà resistenti a siccità e calore estivo, e poco esigenti in termini agronomici. Possono distinguersi erbai precoci, i quali permettono di effettuare più raccolti per ciclo produttivo, o tardivi che facilitano le operazioni di raccolta.

SUMMER KING

Pennisetum glaucum
Vigna sinensis

GG SPIGATURA	n. semi / mq	DISTANZA INTERFILA (cm)	DISTANZA SULLA FILA (cm)
60	140	15	5


DOSE DI SEMINA | 40 KG/HA

CARATTERISTICHE AGRONOMICHE


COMPETIZIONE ALLE INFESTANTI




STATO SANITARIO



RESISTENZA ALLETTAMENTO




RESISTENZA STRESS IDRICO




CARATTERISTICHE QUALITATIVE


RESA



DIGERIBILITÀ



APPORTO NUTRIZIONALE



ERBAIO ESTIVO CICLO RAPIDISSIMO

Miscuglio estivo composto da miglio perlato e vigna, multifalcio, adatto sia al pascolamento che alla fienagione. Presenta ciclo molto rapido ed eccellente capacità di accostamento. Il miscuglio tollera molto bene lo stress idrico e si adatta a svariati contesti pedologici. La consociazione di miglio evigna garantisce un buon apporto sia di carboidrati che di proteine, rendendo il prodotto completo ed equilibrato.

